

## ANGHEL SABINA

Participă la programul de recuperare pe care îl conduce, din august 2003. Atunci avea vârsta de 14. luni. La acel moment copilul se afla la o vârstă motorie de 2 luni. Prezenta o hipotonie generalizată. Mișcarea pe care o făcea era mișcarea de extensie, care atunci când era așezată pe masă era ca opisto-tonusul, iar în culcat ventral se dezechilibra stânga - dreapta (nu putea fi fixată). În așezat copilul nu ținea capul, acesta căzând în special în extensie. Nu putea să ridice membrele superioare deasupra nivelului umerilor. Nu putea să facă contracție pe musculatura abdominală.

Făcea ușoară flexie și extensie a membrelor inferioare. După ce a fost cuprinsă în programul de recuperare și după ce au fost învățate și parthi<sup>1</sup> să lucreze la domiciliu copilul a început să progreseze. După un an - copilul șade la marginea mesei cu, și fără sprijin pe membrele superioare. Dacă i se captează interesul poate să mențină această poziție o perioadă mai mare de timp. Din această poziție ridică mâna să apuce diferite obiecte. Se întoarce spre stânga - dreapta.

- ține capul în poziție verticală, face extensia trunchiului, face flexie și ridică din semi-culcat. Ajută la ridicarea din culcat dorsal și participă corect făcând și flexia capului. Lasă mâna pe masă și se sprijină pe ea la mișcarea amintită.

Se rostogolește, trece peste diferite obstacole, apucă obiecte și le mută, le studiază.

Pe 1 august 2004 a început să se târască din

culcat ventral, trăgându-se cu ajutorul brațelor.  
Face 3-4 repetări și apoi se lasă într-o parte.  
Interes în „pe 4 labe” și stă bine în pe 4 labe cu  
fundul pe calcane.

Problema cea mai mare este că nu prezintă  
reflexul gata pentru săritură. De asemenea cade în diferite  
direcții fără a schita o mișcare de redresare la  
nivelul membrilor superioare sau trunchiului. Totuși  
aceste mișcări de redresare se observă din așezat,  
la nivelul membrilor inferioare.

În programul de recuperare trebuise arătat în  
vedere hiperlaxitatea articulară și displasia luxantă de  
la nivelul coxofemural.

= Nu face alternanță nici la nivelul membrilor  
superioare nici la cele inferioare.

Prof. Hilda Dumangru.

13.05.2005.

Sede la marginea mesei și pe o suprafață mai  
mare fără probleme. Stă dezvoltat controlul asupra trunchiului  
a.î. poate și se ridică singură din culcat dorsal; se întinde  
în culcat ventral din pe genunchi fără să cadă făcând toate  
mișcările firești ale acestui ~~gest~~ <sup>gest</sup>. Dacă este într-o poziție  
mai înaltă (ca pe un scaun mai ~~înalt~~ <sup>înalt</sup> mic) duce mâinile  
spre înainte și se sprijină pe ele când vrea să coboare.  
Nu știe să stea în pe genunchi prin folosirea extensiei ge-  
nunchilor. Face și alternanță la târâre. Continuă să fixeze  
poziția pe „4 labe” dar nu se trece singură în această  
și nu merge. Per ansamblu se observă o evoluție  
îmbunătățire, care îl confirmă puterea și dorința de a  
participa la viața cotidiană și nu de a fi doar observator.